



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR CONSTANȚA.

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI	
INTRARE	Nr. 33
IEȘIRE	788
Ziua	05
Luna	2021

Nr. 1041

Către
Primarii/ Societati
Data - 12.05.2021

Stimate domnule/stimata doamna,

Referitor: buletin avertizare : Eurygaster ssp., Boli foliare ale spicului, Sitona lineatus, Taphrina d., Cocomyses hiemalis, Podosphaera leucotricha, Spaerotheca pannosa, Ceuthorrhynchus a., Coryneum beijerinckii, polstigma rubrum, Plasmopara v., Ucinula necator, Lobesia b., , acarieni, Thrips comun, Musca solanaceelor.

Condițiile climatice din aceasta perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorilor mentionati in buletinul de avertizare, anexat.

In vederea combaterii acestora se recomanda produse de protectie a plantelor (pesticide)(v.Buletinul de avertizare) omologate de Comisia de omologare.

In cazul in care se vor efectua tratamente chimice se vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Sa se respecte cu strictete nonnele de lucru cu produsele de protectie a plantelor (pesticide), pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor respectiv Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania.

Conform acestui ordin, art. nr.4 stipuleaza urmatoarele:

-este interzisa aplicarea pesticidelor, cu exceptia celor atestate prin mentiunea ca nu sunt toxice pentru albine, asupra culturilor agricole entomofile, pomilor fructiferi sau principalelor specii forestiere melifere (salcam, tei) aflate in faze de inflorire.

-art.7 pct. C – Unitatile agricole, sa instiinteze in scris cu cel putin 7 zile inainte de inceperea tratamentului: consiliile locale, comunale, orasenesi sau municipale si primarii dupa caz, pe teritoriul carora se gasesc suprafetele ce urmeaza a fi tratate, comunicand urmatoarele date:

- locul unde se aplica tratamentul

- data inceperii si durata tratamentului

- denumirea produsului folosit si remanenta acestuia

-art.10 – Unitatile cu sector apicol si apicultorii cu stupine personale au urmatoarele obligatii:
- sa anunte in cel mult 24 ore, consiliul local al comunei, orasului sau municipiului si primariile, dupa caz, pe teritoriul careia se afla stupina, locul de amplasare al acestuia, perioada utilizarii vetrei de stupina, numarul familiilor de albine, sediul sau adresa detinatorului de familii de albine, precum si sediul sau adresa la care acesta urmeaza sa fie anuntat in cazul efectuarii unor tratamente fitosanitare.

! Va rugam sa afisati la vedere Buletinul de avertizare (anexat)

Cu stima,

COORDONATOR
Ing. Birsu Onorin

Tel./fax :0040-2415

E-mail : ofconstanta@an101.ro

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 4

Agentul de daunare	Planta -gazda	Produs de protectia plantelor(PPP) recomandat (omologat)	Doza	Grupa de toxicitate	Perioada de tratam./ P.E.D.
Eurygaster spp.si Aelia spp.(plosnitele cerealelor, adulti)	Grau	VANTEX 60 CS	80 ml/ha	Xn	3 ex/mp la Grau samanta, 5 ex/mp la grau de consum
		FASTER 10 EC	150 ml/ha	Xn	
Boli foliare si ale spicului	Cereale	TOPSIN 500 SC	1,250 l/ha	Xn	Aparitie 10% plante atacate
		TOPSIN 70 WDG	1,0 Kg/ha	Xi	
Sitona lineatus (gargarita frunzelor)	Lucerna	KARATE ZEON 5 CS	0,150 l/ha	Xn	5-9 gargarite/mp
Taphrina deformans (bascarea frunzelor)	Piersic	SYLLIT 400 SC	0,2%	Xn	Aparitie
		DITHANE M 45	0,20%	Xn	
Cocomyces hiemalis (patarea purpurie)	Prun Cires Visin	SYLLIT 400 SC	1,3 l/ha	Xn	Aparitie 5% pomi atacati
		DITHANE M 45	0,20%	Xn	
Podosphaera leucotricha	Mar	FLINT PLUS 64 WG	0,125%	Xn	Preventiv
		TOPSIN 70 WDG	0,07%	Xi	
Sphaerotheca Pannosa var. persicae	Piersic	SULPHUR 80 WG	0,03%	Xi	Preventiv sau la apritia a 10% pomi atacati
		MICROTHIOL SPECIAL	0,4 - 0,5 %	Xi	
Ceuthorrhynchus assimilis	Rapita	KARATE ZEON	0,15 l/ha	Xn	Aparitie larve 10% pomi atacati
		MOSPILAN 20 SG	0,20 kg/ha	Xn	
Coryneum beijerinckii (ciuruirea frunzelor)	Cais	DITHANE M 45	0,20%	Xn	Aparitie
Polistigma rubrum (patarea rosie a frunzelor)	Prun	DITHANE M 45	0,20%	Xn	Aparitie
		FOLPAN 80 WDG	0,20%	Xn	
Plasmopara viticola (mana)	Vita de vie	MIKAL FLASH	3 kg /ha	Xi	Aparitie
		CABRIO TOP	1,5 - 2 kg/ha	Xi	
Uncinula necator (fainare)	Vita de vie	TOPAS 100 EC	0,3-0,5 l/ha	Xi	Aparitie
		FOLICUR SOLO 250 EW	0,4 l/ha	Xn	
Lobesia botrana (molia)	Vita de vie	LASER 240 SC	0,15 - 0,20 l/ha	Xi	Aparitie

		SAFRAN 1,8 EC	0,8 – 1 l/ha	Xn	
Acarieni	Vita de vie	SAFRAN 1,8 EC	0,8 – 1 l/ha	Xn	Aparitie
		MILBEKNOCK EC	0,075%	Xi	
Thrips comun	Ceapa	LASER 240 SC	0,04%	Xi	Aparitie
Musca miniera a solanaceelor	Tomate scra	LASER 240 SC	0,05%	Xi	Aparitie

Se mai pot folosi si alte Produse de protectia plantei (PPP), omologate.
 !Sa se respecte perioada de tratament luandu-se in considerare Pragul economic de daunare(P.E.D.), mentionat in Buletinul de avertizare.

INSPECTOR FITOSANITAR,
 Ing. Pavel Monica