



Registru Apicol
15.06.2021
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR CONSTANTA

| | | |
|----------------------------|-------------------|----|
| PRIMĂRIA ORĂȘULUI NĂVODARI | | |
| INTRARE | Nr. <i>4164</i> | |
| IESIRE | <i>14.06.2021</i> | |
| Ziua | Luna | An |

Nr. 1253

Către
Primării/ Societati
Data – 14.06.2021

Stimate domnule/stimata doamna,

Referitor: buletin avertizare : Septoria l., Phytophthora infestans, Sphaeroteca f., Pseudoperonospora c., Hyphantria cunea, Lobesia botrana, Palmopara viticola, Uncinula necator, Acarieni, Leptinotarsa d., Eurygaster spp.

Condițiile climatice din aceasta perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorilor mentionati in buletinul de avertizare, anexat.

In vederea combaterii acestora se recomanda produse de protectie a plantelor (pesticide)(v.Buletinul de avertizare) omologate de Comisia de omologare.

In cazul in care se vor efectua tratamente chimice se vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Sa se respecte cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor (pesticide), pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor respectiv Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania.

Conform acestui ordin, art. nr.4 stipuleaza urmatoarele:

-este interzisa aplicarea pesticidelor, cu exceptia celor atestate prin mentiunea ca nu sunt toxice pentru albine, asupra culturilor agricole entomofle, pomilor fructiferi sau principalelor specii forestiere melifere (salcam, tei) aflate in faze de inflorire.

-art.7 pct. C – Unitatile agricole, sa instiinteze in scris cu cel putin 7 zile inainte de inceperea tratamentului: consiliile locale, comunale, orasenesti sau municipale si primarii dupa caz, pe teritoriul carora se gasesc suprafetele ce urmeaza a fi tratate, comunicand urmatoarele date:

- locul unde se aplica tratamentul

- data inceperii si durata tratamentului

- denumirea produsului folosit si remanenta acestuia

-art.10 – Unitatile cu sector apicol si apicultorii cu stupine personale au urmatoarele obligatii:

- sa anunte in cel mult 24 ore, consiliul local al comunei, orasului sau municipiului si primariile, dupa caz, pe teritoriul careia se afla stupina, locul de amplasare al acestuia, perioada utilizarii vetrei de stupina, numarul familiilor de albine, sediul sau adresa detinatorului de familii de albine, precum si sediul sau adresa la care acesta urmeaza sa fie anuntat in cazul efectuarii unor tratamente fitosanitare.

! Va rugam sa afisati la vedere Buletinul de avertizare (anexat)

Cu stima,

COORDONATOR,
Ing. Birsu Onoriu

Tel./fax :0040-241-510246

E-mail : ofconstanta@anf.ro



22/3

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 7

| Agentul de daunare | Planta -gazda | Produs de protectia plantelor(PPP) recomandat (omologat) | Doza | Grupa de toxicitate | Perioada de tratam./ P.E.D. |
|---|--|--|--|---------------------|---|
| Septoria Lycopersici (patara alba a frunzelor) | Tomate | POLYRAM DF | 0,2% | Xi | Aparitie 10-20% plante atacate |
| | | DITHANE NEOTEC 75 WG | 0,20% | Xi | |
| Phytophthora infestans | Tomate | CUPROXAT FLOWABLE | 3-4 l/ha 5,3 l/ha (spatii protejate) | Xi | Aparitie 10-20% plante atacate |
| | | POLYRAM DF | 0,2% | Xi | |
| Alte produse omologate | | | | | |
| Sphaeroteca fuliginea (fainare) | Castraveti | KUMULUS DF | 0,4% | Xi | Aparitie 20% plante atacate |
| | | ORIU 25 EW | 0,05% | Xi | |
| Pseudoperonospora cubensis (mana) | Castraveti | POLYRAM DF | 0,2% | Xi | Aparitie 20% plante atacate |
| | | PREVICUR ENERGY | 3 l/ha | Xi | |
| Hyphantria cunea gen. I (Omida paroasa a dudului) | Pomi fructiferi, arbori izolati si de aliniament | KAISO SORBIE 5 EG | 0,15 kg/ha | Xn | Aparitie 1- 2cuiburi pe pom |
| | | KARATE ZEON | 0,015% | Xn | |
| Lobesia botrana (molia vitei de vie) | Vita de vie | CYPERGUARD 25 EC | 0,02% | Xn | Aparitia larvelor 10% ciorchini atacati |
| | | KARATE ZEON | 0,015% | Xn | |
| Plasmopara viticola (mana) | Vita de vie | MIKAL FLASH | 3,0 kg/ha | Xi | Aparitie 10% plante atacate |
| | | CURZATE F | 2,5 l/ha | Xi | |
| Uncinula necator (fainare) | Vita de vie | TOPAS 100 EC | 0,3-0,5 l/ha | Xi | Aparitia a 5 - 10%plante atacate |
| | | KARATHANE GOLD 350 EC | 0,5 l/ha | Xn | |
| Acarieni | Vita de vie | SAFRAN 1,8 EC | 0,8 - 1 l/ha | Xn | 2-3 ex./frunza |
| | | VERTIMEC 1,8 % EC | 0,75 - 1l/ha | Xn | |
| Leptinotarsa decemlineata (gandacul de Colorado) | cartof | CYPERGUARD 25 EC | 0,08 l/ha | Xn | Aparitia a 0,5-1 ex./mp |
| | | DECIS 25 WG | 30-40g/ha | Xi | |